

# ZWALCZANIE CHRABĄSZCZY


Chrabąszcz pojawia się zazwyczaj co 4—5 lat (zależnie od gatunku) w maju. Larwy chrabąszcza (pędraki) wylęte z jaj przebywają w ziemi 3—4 lata, podgryzając korzenie roślin uprawnych. W trzecim lub czwartym roku życia pędraki zamieniają się w poczwarki i następną wiosną wylęgają się z nich chrabąszcze.



ROZWÓJ CHRABĄSZCZA: A = jaja; B, C = pędraki; D = poczwarka; E = chrabąszcz z ziemi przed wylotem; F = samica wydobywająca się z ziemi; G = samiec.

## Sposoby niszczenia chrabąszczy

1. Zbieranie chrabąszczy w czasie rójki — (patrz rysunek). Należy rozpocząć je natychmiast po pojawieniu się i powtarzać kilkakrotnie. Zebrane chrabąszcze zabić gorącą wodą.
2. Podczas każdej uprawy ziemi zbierać i niszczyć pędraki.
3. Ochroniać ptactwo pożyteczne, które wybiera z ziemi pędraki i niszczy chrabąszcze.



Stacja Ochrony Roślin Białostockiej Izby Rolniczej — Białystok, ul. Br. Pierackiego 57-a, tel. 16-04.